

## 4. feladatsor – Absztrakt algebra

### 4.1. Feladat. Művelet-e

- (a) a szokásos összeadás, illetve szorzás a  $\{3k \mid k \in \mathbb{N}\}$  halmazon;
- (b) a szokásos összeadás, illetve szorzás a 3-jegyű pozitív egész számok halmazán;
- (c) a szokásos összeadás, illetve szorzás az  $\{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}^+\}$  halmazon;
- (d) a metszés, illetve egyesítés az  $\{\emptyset, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \{1, 2, 3, 4\}\}$  halmazon;
- (e) a szokásos összeadás a  $\mathbb{Z}_4$  halmazon;
- (f) a szokásos összeadás a  $\{\bar{0}, \bar{3}, \bar{6}\}$  halmazon, ahol  $\bar{0}, \bar{3}, \bar{6} \in \mathbb{Z}_9$ ?

**4.2. Feladat.** Készítsük el az alábbi grupoidok műveletábráját, és ennek alapján állapítsuk meg, hogy melyik grupoid kommutatív, melyekben van zéruselem, illetve egységelem. Az egységelemes grupoidokban határozzuk meg, hogy mely elemeknek van inverze.

- (a)  $(\{-1, 0, 1\}; \cdot)$ ;
- (b)  $(\{-1, 0, 1\}; \sqcup)$ , ahol  $a \sqcup b = \max(a, b)$ ;
- (c)  $(P(\{1, 2\}); \setminus)$ ;
- (d)  $(\{\mathbf{i}, \mathbf{h}\}; \rightarrow)$ , ahol  $\mathbf{i}$  az igaz,  $\mathbf{h}$  a hamis logikai érték.

**4.3. Feladat.** Az alábbi műveletábrázatok alapján döntsük el, hogy kommutatív-e, cancellatív-e a művelet, van-e a grupoidban zéruselem, illetve egységelem? Ha van egységelem, akkor mely elemeknek van inverze?

	$\circ$	$a$	$b$	$c$	$d$
	$a$	$a$	$a$	$a$	$a$
(a)	$b$	$a$	$b$	$c$	$d$
	$c$	$b$	$c$	$b$	$b$
	$d$	$d$	$d$	$a$	$a$

	$*$	$a$	$b$	$c$	$d$
	$a$	$a$	$b$	$c$	$d$
(b)	$b$	$b$	$c$	$a$	$a$
	$c$	$c$	$a$	$b$	$a$
	$d$	$d$	$d$	$d$	$d$

**4.4. Feladat.** Vizsgáljuk meg, hogy a következő grupoidok asszociatívak-e, kommutatívak-e, van-e bennük zéruselem, illetve egységelem. Az egységelemes grupoidokban keressük meg azokat az elemeket, amelyeknek van inverze. Ez alapján döntsük el, hogy a grupoid, félcsoportot, monoidot vagy csoportot alkot-e.

- (a)  $(\mathbb{Q}; \circ)$ , ahol  $q \circ r = q$ ;
- (b)  $(\mathbb{N}; *)$ , ahol  $m * n = mn - m + n$ ;
- (c)  $(\mathbb{R}; \square)$ , ahol  $x \square y = 12 - 3x - 3y + xy$ ;
- (d)  $(\mathbb{R}; \triangle)$ , ahol  $x \triangle y = xy - 2(x + y) + 6$ ;
- (e)  $(\mathbb{R}; \sqcup)$ , ahol  $x \sqcup y = \max(x, y)$ ;
- (f)  $(\{r \in \mathbb{R} \mid 0 \leq r \leq 1\}; \oplus)$ , ahol  $x \oplus y = |x - y|$ .

**4.5. Feladat.** Vizsgálja meg, hogy a következő grupoidok közül melyek félcsoportok, melyek monoidok, melyek csoportok, és melyek Abel-csoportok. (Jelölje  $M_2$  a  $2 \times 2$ -es valós mátrixok halmazát.)

- (a)  $(\mathbb{N}; +)$ ;
- (b)  $(\mathbb{N}_0; +)$ ;
- (c)  $(\mathbb{Z}; +)$ ;
- (d)  $(\mathbb{Q}; +)$ ;
- (e)  $(\mathbb{Z}_{12}; +)$ ;
- (f)  $(\mathbb{Z}; \cdot)$ ;
- (g)  $(\mathbb{Q}; \cdot)$ ;
- (h)  $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}; \cdot)$ ;
- (i)  $(\mathbb{R}^+; \cdot)$ ;
- (j)  $(\mathbb{Z}_{12}; \cdot)$ ;
- (k)  $(P(\mathbb{N}); \cap)$ ;
- (l)  $(P(\mathbb{N}); \Delta)$ ;
- (m)  $(M_2; +)$ ;
- (n)  $(M_2; \cdot)$ .

**4.6. Feladat.** Az alábbi állítások közül melyek érvényesek tetszőleges csoport minden  $a, b, x, y$  elemére?

- (a) Ha  $a^{-1} = b^{-1}$ , akkor  $a = b$ .  
 (b) Ha  $xa = ay$ , akkor  $x = y$ .  
 (c) Ha  $abx = 1$ , akkor  $x = a^{-1}b^{-1}$ .  
 (d) Ha  $(ab)^2 = a^2b^2$ , akkor  $ab = ba$ .

**4.7. Feladat.** Melyek alkotnak gyűrűt, és melyek alkotnak testet az alábbiakban megadott algebraik közül? (Jelölje  $M_2$  a  $2 \times 2$ -es valós mátrixok halmazát.)

- (a)  $(\mathbb{N}; +; \cdot)$ ; (b)  $(\mathbb{Z}; +; \cdot)$ ; (c)  $(\mathbb{Q}; +; \cdot)$ ; (d)  $(\mathbb{R}; +; \cdot)$   
 (e)  $(\mathbb{Z}_{12}; +; \cdot)$ ; (f)  $(\mathbb{Z}_{13}; +; \cdot)$ ; (g)  $(P(\mathbb{N}); \Delta; \cap)$ ; (h)  $(M_2; +; \cdot)$ .

**4.8. Feladat.** Végezzük el a következő műveleteket a  $\mathbb{Z}_{17}$  testben.

- (a)  $\bar{9} + \bar{12}$ ; (b)  $\bar{2} \cdot \bar{11}$ ; (c)  $\frac{\bar{2}}{\bar{9}}$ ; (d)  $\bar{11}^{18}$ ; (e)  $\bar{11}^{15}$ .

**4.9. Feladat.** Végezzük el a következő műveleteket a  $\mathbb{Z}_{15}$  gyűrűben.

- (a)  $\bar{8} + \bar{9}$ ; (b)  $\bar{3} \cdot \bar{8}$ ; (c)  $\frac{\bar{2}}{\bar{7}}$ ; (d)  $\frac{\bar{1}}{\bar{5}}$ ; (e)  $\bar{2}^{10}$ .

**4.10. Feladat.** A  $\mathbf{T} = (\{a, b, c, d\}; \circ)$  grupoid művelet táblája:

$\circ$	$a$	$b$	$c$	$d$
$a$	$a$	$c$	$b$	$d$
$b$	$b$	$c$	$b$	$a$
$c$	$c$	$a$	$c$	$a$
$d$	$d$	$c$	$a$	$d$

Határozzuk meg a  $\mathbf{T}$  grupoid következő részalgebrait, valamint adjuk meg  $T$  egy minimális generátorrendszerét.

- (a)  $[a]$ ; (b)  $\{b, c\}$ ; (c)  $[b]$ ; (d)  $[d]$ ; (e)  $\{b, c, d\}$ .

**4.11. Feladat.** Határozzuk meg a  $G$  csoport  $A$  részhalmaza által generált részcsoportot.

- (a)  $G = (\mathbb{Z}_4; +)$ ,  $A = \{\bar{2}\}$ ; (b)  $G = (\mathbb{Z}_4; +)$ ,  $A = \{\bar{3}\}$ ;  
 (c)  $G = (\mathbb{Z}_6; +)$ ,  $A = \{\bar{2}\}$ ; (d)  $G = (\mathbb{Z}_{12}; +)$ ,  $A = \{\bar{8}, \bar{10}\}$ ;  
 (e)  $G = (\mathbb{Q}; +)$ ,  $A = \mathbb{N}$ ; (f)  $G = (\mathbb{R} \setminus \{0\}; \cdot)$ ,  $A = \mathbb{Q}^-$ .

**4.12. Feladat.** Határozzuk meg a  $G$  csoportban az  $a$  elem rendjét.

- (a)  $G = (\mathbb{Z}_4; +)$ ,  $a = \bar{2}$ ; (b)  $G = (\mathbb{Z}_4; +)$ ,  $a = \bar{3}$ ;  
 (c)  $G = (\mathbb{Z}_6; +)$ ,  $a = \bar{2}$ ; (d)  $G = (\mathbb{C} \setminus \{0\}; \cdot)$ ,  $a = i$ .

**4.13. Feladat.** Legyen  $G$  csoport,  $H$  részcsoport és  $a, b \in G$ . Határozzuk meg az  $a$  elem  $H$  szerinti baloldali mellékosztályát, és döntsük el, hogy eleme-e ennek a mellékosztálynak a  $b$  elem.

- (a)  $G = (\mathbb{Z}_6; +)$ ,  $H = [\bar{3}]$ ,  $a = \bar{1}$ ,  $b = \bar{2}$ ;  
 (b)  $G = (\mathbb{Z}; +)$ ,  $H = \{3k : k \in \mathbb{Z}\}$ ,  $a = 2$ ,  $b = -4$ ;  
 (c)  $G = (\mathbb{R}^2; +)$ ,  $H = \{(x, x) : x \in \mathbb{R}\}$ ,  $a = (3, 4)$ ,  $b = (-8, -7)$ ;  
 (d)  $G = (\mathbb{Z}^2; +)$ ,  $H = \{(5x, -2x) : x \in \mathbb{Z}\}$ ,  $a = (2, -1)$ ,  $b = (17, -5)$ .

**4.14. Feladat.** Az  $\mathbf{A} = (\{0, 1, 2\}; \circ)$ ,  $\mathbf{B} = (\{a, b, c\}; *)$ ,  $\mathbf{C} = (\{p, q, r\}; \square)$  és  $\mathbf{D} = (\{-1, 0, 1\}; \cdot)$  grupoidok művelet táblázatai a következők.

$\circ$	0	1	2	$*$	$a$	$b$	$c$	$\square$	$p$	$q$	$r$	$\cdot$	-1	0	1
0	0	1	2	$a$	$a$	$b$	$c$	$p$	$p$	$p$	$p$	-1	1	0	-1
1	1	0	2	$b$	$b$	$c$	$a$	$q$	$p$	$q$	$r$	0	0	0	0
2	2	2	2	$c$	$c$	$a$	$b$	$r$	$p$	$r$	$q$	1	-1	0	1

Döntsük el, hogy mely grupoidok izomorfak. (Adjuk meg az izomorfizmusokhoz tartozó leképezéseket.)

**4.15. Feladat.** Az előző feladatban megadott  $\mathbf{A}$ ,  $\mathbf{B}$ ,  $\mathbf{C}$  grupoidokra igazak-e a következő állítások?

- (a) Legyen  $\mathcal{C}_1 = \{\{p\}\{q, r\}\}$  osztályozás a  $\mathbf{C}$  grupoid alaphalmazán. A  $\mathcal{C}_1$  osztályozáshoz tartozó  $\alpha$  ekvivalenciareláció kongruencia  $\mathbf{C}$ -n.
- (b) Legyen  $\mathcal{C}_2 = \{\{0\}\{1, 2\}\}$  osztályozás az  $\mathbf{A}$  grupoid alaphalmazán. A  $\mathcal{C}_2$  osztályozáshoz tartozó  $\beta$  ekvivalenciareláció kongruencia  $\mathbf{A}$ -n.
- (c) Legyen  $\gamma$  kongruencia  $\mathbf{A}$ -n. Ha  $(0, 1) \in \gamma$ , akkor szükségképpen  $(1, 2) \in \gamma$ .
- (d) Legyen  $\delta$  kongruencia  $\mathbf{B}$ -n. Ha  $(a, b) \in \delta$ , akkor szükségképpen  $(a, c) \in \delta$ .

**4.16. Feladat.** A  $\mathbf{T} = (\{a, b, c, d\}; *)$  grupoid művelet táblája:

$*$	$a$	$b$	$c$	$d$
$a$	$b$	$b$	$d$	$d$
$b$	$a$	$c$	$c$	$a$
$c$	$b$	$d$	$d$	$b$
$d$	$a$	$c$	$a$	$c$

Döntsük el, hogy az alábbi osztályozásokhoz tartozó ekvivalenciarelációk kongruenciák-e  $\mathbf{T}$ -n.

- (a)  $\mathcal{C}_1 = \{\{a, b\}, \{c, d\}\}$ ;
- (b)  $\mathcal{C}_2 = \{\{a, b, c, d\}\}$ ;
- (c)  $\mathcal{C}_3 = \{\{a, b, c\}, \{d\}\}$ ;
- (d)  $\mathcal{C}_4 = \{\{a, c\}, \{b, d\}\}$ ;
- (e)  $\mathcal{C}_5 = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}\}$ .

## 4. feladatsor – Absztrakt algebra MEGOLDÁSOK

### 4.1. Feladat.

- (a) igen, igen; (b) nem, nem; (c) igen, nem; (d) igen, igen; (e) igen; (f) igen.

### 4.2. Feladat. .

- (a) A grupoid kommutatív, zéruseleme: 0, egységeleme: 1, az invertálható elemek halmaza:  $\{1, -1\}$ ;  
(b) A grupoid kommutatív, zéruseleme: 1, egységeleme:  $-1$ , az invertálható elemek halmaza:  $\{-1\}$ ;  
(c) A grupoid nem kommutatív, zéruseleme nincs, egységeleme nincs, az invertálható elemek halmaza:  $\emptyset$ ;  
(d) A grupoid nem kommutatív, zéruseleme nincs, egységeleme nincs, az invertálható elemek halmaza:  $\emptyset$ .

### 4.3. Feladat. .

- (a) A grupoid nem kommutatív, nem cancellatív, zéruselem nincs, a  $b$  elem egységelem, a  $b$  és  $c$  elemeknek van inverze:  $b^{-1} = b$ ,  $c^{-1} = c$ ;  
(b) A grupoid nem kommutatív, nem cancellatív, zéruselem nincs, az  $a$  elem egységelem, az  $a$ ,  $b$  és  $c$  elemeknek van inverze:  $a^{-1} = a$ ,  $b^{-1} = c$ ,  $c^{-1} = b$ .

### 4.4. Feladat. .

- (a) A grupoid asszociatív, nem kommutatív, zéruseleme nincs, egységeleme nincs, az invertálható elemek halmaza:  $\emptyset$ , félcsoport;  
(b) A grupoid nem asszociatív, nem kommutatív, zéruseleme nincs, egységeleme nincs, az invertálható elemek halmaza:  $\emptyset$ ;  
(c) A grupoid asszociatív, kommutatív, zéruseleme: 3, egységeleme: 4, az invertálható elemek halmaza:  $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ . Monoid és  $(\mathbb{R} \setminus \{3\}; \square)$  csoport;  
(d) A grupoid asszociatív, kommutatív, zéruseleme: 2, egységeleme: 3, az invertálható elemek halmaza:  $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ . Monoid és  $(\mathbb{R} \setminus \{2\}; \triangle)$  csoport;  
(e) A grupoid asszociatív, kommutatív, zéruseleme nincs, egységeleme nincs, az invertálható elemek halmaza:  $\emptyset$ , félcsoport;  
(f) A grupoid nem asszociatív, kommutatív, zéruseleme nincs, egységeleme: 0, az invertálható elemek halmaza:  $\{r \in \mathbb{R} \mid 0 \leq r \leq 1\}$ .

### 4.5. Feladat.

- (a) félcsoport; (b) monoid; (c) Abel-csoport; (d) Abel-csoport;  
(e) Abel-csoport; (f) monoid; (g) monoid; (h) Abel-csoport;  
(i) monoid; (j) monoid; (k) monoid; (l) Abel-csoport;  
(m) Abel-csoport; (n) monoid.

### 4.6. Feladat. .

- (a) érvényes;  
(b) nem érvényes;  
(c) nem érvényes;  
(d) érvényes.

**4.7. Feladat.**

- (a) nem gyűrű; (b) gyűrű; (c) test; (d) test; (e) gyűrű; (f) test;  
 (g) gyűrű; (h) gyűrű.

**4.8. Feladat.**

- (a)  $\bar{4}$ ; (b)  $\bar{5}$ ; (c)  $\bar{4}$ ; (d)  $\bar{2}$ ; (e)  $\bar{14}$ .

**4.9. Feladat.**

- (a)  $\bar{2}$ ; (b)  $\bar{9}$ ; (c)  $\bar{11}$ ; (d) nem végezhető el; (e)  $\bar{4}$ .

**4.10. Feladat.**

- (a)  $\{a\}$ ; (b)  $\{a, b, c\}$ ; (c)  $\{a, b, c\}$ ; (d)  $\{d\}$ ; (e)  $\{a, b, c, d\}$ .

$T$  egy minimális generátorrendszere:  $\{b, d\}$

**4.11. Feladat.**

- (a)  $\{\bar{0}, \bar{2}\}$ ; (b)  $\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$ ; (c)  $\{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}$ ; (d)  $\{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{6}, \bar{8}, \bar{10}\}$ ;  
 (e)  $(\mathbb{Z}; +)$ ; (f)  $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}; \cdot)$ .

**4.12. Feladat.**

- (a)  $o(\bar{2}) = 2$ ; (b)  $o(\bar{3}) = 4$ ; (c)  $o(\bar{2}) = 3$ ; (d)  $o(i) = 4$ .

**4.13. Feladat. .**

- (a)  $\bar{1} + H = \{\bar{1}, \bar{4}\}$ ,  $\bar{2}$  nem eleme;  
 (b)  $2 + H = \{3k + 2 : k \in \mathbb{Z}\}$ ,  $-4 = 3(-2) + 2$  eleme;  
 (c)  $(3, 4) + H = \{(x + 3, x + 4) : x \in \mathbb{R}\}$ ,  $(-8, -7) = (-11 + 3, -11 + 4)$  eleme;  
 (d)  $(2, -1) + H = \{(5x + 2, -2x - 1) : x \in \mathbb{Z}\}$ ,  $(17, -5)$  nem eleme.

**4.14. Feladat.  $\mathbf{A} \cong \mathbf{C} \cong \mathbf{D}$ .**

- $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{C}$ ;  $0 \mapsto q, 1 \mapsto r, 2 \mapsto p$ .  
 $\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ ;  $p \mapsto 0, q \mapsto 1, r \mapsto -1$ .  
 $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{D}$ ;  $0 \mapsto 1, 1 \mapsto -1, 2 \mapsto 0$ .

**4.15. Feladat. .**

- (a) igaz,  
 (b) hamis,  
 (c) hamis,  
 (d) igaz.

**4.16. Feladat. .**

- (a) nem,  
 (b) igen,  
 (c) nem,  
 (d) igen,  
 (e) igen.